

Yunnan Baiyao dla psow

Poradnik dla opiekunów: wsparcie przy krwawieniu i bezpieczniejsze użycie w domu

Co otrzymasz: jasny, nastawiony na bezpieczeństwo i współpracę z weterynarzem poradnik, jak rozpoznać, kiedy krwawienie jest nagłym przypadkiem, jak bezpieczniejsze stosować produkty w domu, jak dawkować wg masy ciała oraz co monitorować.

Użyj tego poradnika w 60 sekund

- 1) Zaczynij od **strony Decyzja w nagłym przypadku**.
- 2) Jeśli weterynarz zaleci Yunnan Baiyao, przejdź do strony **Dawkowanie + schemat**.
- 3) Użyj **dziennika opiekuna**, aby śledzić zmiany i przekazać jasne informacje weterynarzowi.



Zdjęcie identyfikacyjne

Przykładowe opakowanie. Opakowanie może różnić się w zależności od dostawcy/regionu.

Udostępnione przez TCMVET • Ostatnia aktualizacja: 2026-02-01

tcm-vet.com

Spis treści

Decyzja w nagłym przypadku	1
Co to jest / czym nie jest	2
Kiedy opiekunowie najczęściej to rozważają	3
Stosowanie (doustnie) + zasada czerwonej kapsułki	4
Stosowanie (miejscowe): praktyczne kroki	5
Dawkowanie (wg masy) + schemat	6
Monitorowanie + dziennik opiekuna	7
Rozwiązywanie problemów: co zrobić gdy...	8
Przegląd dowodów + pytania do weterynarza	9
Następne kroki + zasoby	10

Szybka nawigacja (najczęściej używane strony)

Nagły przypadek: p1 **Dawkowanie:** p6 **Dziennik:** p7 **Problemy:** p8

Podsumowanie bezpieczeństwa

Nagły przypadek - jedź teraz

- Zasłabnięcie, skrajna słabość lub trudność z wstaniem
- Błede/białe dziasia
- Silne krwawienie, które nie ustępuje
- Podejrzenie krwawienia wewnętrznego (wzdęcie brzucha, czarne/smoliste stolce)

Zadzwoń do weterynarza dzisiaj

- Nawracające krwawienia z nosa
- Krwawiąca masa/guz
- Nietypowe siniaki lub krwawienie z dziaseł
- Krwawienie + leki (chemioterapia/przeciwwkrzepliwe) - zadzwoń do weterynarza

Jeśli nie masz pewności, wybierz bezpieczniejszą opcję: zadzwoń do weterynarza.

Tylko informacje edukacyjne. Ten poradnik nie zastępuje diagnozy weterynaryjnej ani opieki w nagłych przypadkach.

Decyzja w nagłym przypadku

Jesli Twój pies jest słaby, blady, zasłabnie lub mocno krwawi, traktuj to jako nagły przypadek i jak najszybciej szukaj pomocy weterynaryjnej.

Jedź na ostry dyżur weterynaryjny natychmiast, jeśli widzisz:

- Zasłabnięcie lub brak możliwości wstania
- Skrajna słabość, splątanie lub szybki oddech
- Błede/białe dziasia
- Silne krwawienie, które nie ustępuje
- Możliwe krwawienie wewnętrzne: nagła słabość, wzdęcie brzucha, czarne/smoliste stolce

Zadzwoń do weterynarza dzisiaj (nie czekaj), jeśli:

- Krwawienia z nosa nawracają lub się nasilają
- Krwawiąca masa lub guz (w tym guzy nosa)
- Pojawiają się nowe lub niewyjaśnione siniaki
- Krwawienie + leki na receptę (szczególnie chemioterapia lub leki przeciwkrzepliwe)

Dlaczego to ważne: krwawienie może być zewnętrzne lub wewnętrzne. Krwawienie wewnętrzne może szybko się pogorszyć i nie jest bezpieczne do leczenia w domu.

Zadzwoń do weterynarza - co powiedzieć (30 sekund)

"Mój pies krwawi z ___ (nos / rana / guz)."

"Kolor dziaseł: ___; energia: ___."

"Początek o ___; częstotliwość: ___."

"Aktualne leki: ___."

Co to jest / czym nie jest

Yunnan Baiyao to tradycyjna formuła ziołowa, często rozważana jako wsparcie kontroli krwawienia u psów pod nadzorem weterynarza.

Co to jest

Wielu opiekunów i weterynarzy traktuje Yunnan Baiyao jako dodatkowe wsparcie: może pomóc w niektórych sytuacjach krwawienia, gdy pies otrzymuje odpowiednią opiekę weterynaryjną.

Czym nie jest

- Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani opieki w nagłych przypadkach
- Nie gwarantuje efektu (reakcje różnią się w zależności od przyczyny i osobnika)
- Nie jest powodem, aby opóźnić pilną pomoc, gdy krwawienie jest silne lub pies wygląda na chorego

Jeśli nie wiesz, czy krwawienie jest poważne, wybierz bezpieczniejszą opcję: skontaktuj się z weterynarzem lub kliniką całodobową.

Rób / Unikaj (szybkie granice)

Rób: stosuj jako część planu z weterynarzem.

Rób: notuj zmiany codziennie.

Unikaj: opóźniania pomocy w nagłym przypadku przy słabości/bładości lub silnym krwawieniu.

Kiedy opiekunowie najczęściej to rozważają

Opiekunowie rozważają Yunnan Baiyao w konkretnych sytuacjach krwawienia, ale opinia weterynarza jest kluczowa przy chorobie podstawowej lub lekach.

Częste sytuacje

- Krwawienie związane z guzami (np. krwawienie z nosa lub kruche masy)
- Lekkie do umiarkowanego krwawienie zewnętrzne (małe skaleczenia, krwawienie po obcięciu pazurów)
- Wsparcie po zabiegu (tylko jeśli zaleci weterynarz)
- Nagłe epizody krwawienia, gdy potrzebujesz jasnego planu

Najpierw porozmawiaj z weterynarzem, jeśli pies:

- Przyjmuje leki na receptę (szczególnie chemioterapia lub przeciwkrzepliwe)
- Ma chorobę wątroby lub nerek
- Jest bardzo stary, bardzo mały lub ma wiele schorzeń
- Ma nawracające niewyjaśnione krwawienia

Sygnaly alarmowe, które zmieniają plan

Przestaj "czekać w domu" i zadzwoń do weterynarza, jeśli widzisz:

- blade/białe dziąsła
- zasłabnięcie/wyraźna słabość
- szybki oddech
- krwawienie, które nie ustępuje

Stosowanie (doustnie) + zasada czerwonej kapsułki

Stosowanie doustne: podawaj z jedzeniem w razie potrzeby, trzymaj się planu i traktuj czerwoną kapsułkę awaryjną wyłącznie jako wsparcie pod nadzorem weterynarza.

Podstawy (dla opiekunów)

- Podawaj z jedzeniem, jeśli pies ma wrażliwy żołądek.
- Kapsułki: podaj bezpośrednio lub ukryj w małym przysmaku. Jeśli weterynarz i etykieta pozwalają, możesz otworzyć kapsułkę i wymieszać zawartość z mokrą karmą.
- Proszek: najpierw wymieszaj w małej porcji karmy, aby pies zjadł całą dawkę.

Czerwona kapsułka awaryjna (jeśli jest w zestawie)

Używać tylko w nagłych przypadkach i tylko zgodnie z zaleceniem weterynarza. Nie jest przeznaczona do codziennego stosowania.

Przegląd schematu

Wielu weterynarzy preferuje schematy cykliczne (co drugi dzień lub 5 dni podawania / 5 dni przerwy) z regularną reevaluacją.

Wskazówki podawania (aby uniknąć pominiętych dawek)

- Zaczynaj od **małej** porcji; upewnij się, że pies zjadł wszystko.
- Proszek: wymieszaj w **małej** ilości mokrej karmy, a potem dokończ posiłek.
- Przy utrzymujących się wymiotach lub bieguncie: **przerwij i zadzwon do weterynarza.**

Stosowanie (miejscowe): praktyczne kroki

Stosowanie miejscowe powinno być proste i zgodne z etykieta - głębokie rany lub niekontrolowane krwawienie wymagają opieki weterynaryjnej.

Lista kontrolna

- Delikatnie oczyścić
- Sprawdzić głębokość (ukłucie/ugryzienie = najpierw weterynarz)
- Użyć formy miejscowej odpowiedniej wg etykiety
- Regularnie kontrolować; utrzymywać opatrunek czysty i suchy

Rany, które najpierw powinien zobaczyć weterynarz: rany po ugryzieniu i ukłuciu mogą zatrzymywać bakterie pod skórą. Nie lecz samodzielnie - skonsultuj się z weterynarzem.

Unikaj

- Nie stosuj produktów na otwarte rany, jeśli etykieta tego zabrania.
- Nie lecz w domu głębokich ukłuc, ran po ugryzieniu ani dużych rozdar█.
- Nie ignoruj narastającego obrz█ku, bólu, zapachu lub wydzieliny - może to oznaczać infekcję.

Dawkowanie (wg masy) + schemat

Stosuj zasady dawkowania wg masy ciała oraz schemat cykliczny, a następnie reevaluj z weterynarzem.

Masa psa	Kapsulki	Proszek
Ponizej 10 lb	1 kapsulka 1x dziennie	25 mg 1x dziennie
10-30 lb	1 kapsulka 2x dziennie	25 mg 2x dziennie
31-60 lb	2 kapsulki 2x dziennie	50 mg 2x dziennie
Powyzej 60 lb	2 kapsulki 3x dziennie	50 mg 3x dziennie

Uwaga: ilości w mg dotyczą tylko produktów w proszku. Zawsze stosuj etykiety konkretnego produktu.

Sugerowany schemat (czesto stosowany)

- Co drugi dzień, LUB
- 5 dni podawania / 5 dni przerwy (powtarzac w razie potrzeby)

Dobra praktyka: wielu weterynarzy preferuje najniższą skuteczną dawkę i regularną reevaluację.

Wybor schematu (uzgodnij z weterynarzem)

- Przy **przerywanym** krwawieniu często stosuje się schemat **cykliczny** (co drugi dzień lub 5/5).
- Przy **wysokim** ryzyku krwawienia: trzymaj się planu weterynarza i wcześniej reevaluj.

Monitorowanie + dziennik opiekuna

Codzienne monitorowanie pomaga szybko zauważyć zmiany i jasno przekazać informacje weterynarzowi.

Monitoruj codziennie

- Ilość i częstotliwość krwawienia
- Energia i apetyt
- Kolor dziąseł (rozowe vs blade/białe)
- Stolec (szczególnie czarny/smolisty)
- Pragnienie i oddawanie moczu (zmiany)

Przykład (jak to zapisać)

10 sty | lekkie krwawienie z nosa x1 | apetyt normalny | dziąsła rozowe | stolec normalny | zadzwon, jeśli się powtórzy

Prosty dziennik (wydruk lub zrzut ekranu)

Data	Krwawienie	Energia	Dziąsła	Stolec	Notatki

Rozwiązywanie problemów: co zrobić gdy...

Jesli objawy sie nasilaja lub pojawiaja sie nowe niepokojace sygnaly, przerwij i szybko skontaktuj sie z weterynarzem.

Przerwij i zadzwon do weterynarza (lub na ostry dyzur) jesli:

- Krwawienie sie nasila lub wraca czesciej
- Utrzymujaca sie biegunka lub wymioty
- Wyrazna apatia, slabosc lub blade dziasla
- Oznaki alergii (obrzek twarzy, pokrzywka, silny swiad)

Jesli zmiany sa lagodne (a pies stabilny):

- Kontynuuj obserwacje i zapisuj w dzienniku.
- Skontaktuj sie z weterynarzem, jesli trwa to dluzej niz 24 godziny lub pies czuje sie zle.

Przypomnienie: ten poradnik nie zastepuje opieki weterynaryjnej. W razie watpliwosci - zadzwon do weterynarza.

STOP & zadzwon do weterynarza

silne/nasilajace sie krwawienie, blade dziasla, zaslabniecie, oznaki alergii.

OBSERWUJ

lagodne dolegliwosci GI < 24h, energia stabilna, krwawienie sie poprawia.

OK kontynuuj

stabilny stan, krwawienie kontrolowane, normalny apetyt/energia - zgodnie z planem weterynarza.

Przegląd dowodów + pytania do weterynarza

Dowody są wspierające, ale nie ostateczne - weterynarz pomoże przelozyc je na bezpieczny plan dla Twojego psa.

Przegląd dowodów (prosto)

Badania nad Yunnan Baiyao u psow obejmują pomiary krzepnięcia u zdrowych psow, badania laboratoryjne na liniach komorkowych nowotworów oraz opisy przypadków. Wyniki sugerują możliwe wsparcie w niektórych sytuacjach, ale reakcje różnią się i nie są gwarantowane.

Co to oznacza dla opiekunów: stosuj Yunnan Baiyao tylko jako część planu z weterynarzem. Jeśli krwawienie jest silne albo pies jest słaby/blady, priorytetem jest pomoc natychmiast. Monitoruj codziennie i reevaluuuj z weterynarzem.

Pytania do weterynarza (zabierz te strone)

- Czy krwawienie jest prawdopodobnie zewnętrzne, z nosa/ust, czy może być wewnętrzne?
- Jakie sygnały alarmowe dotyczą mojego psa (dziasia, słabość, oddech, zasłabnięcie)?
- Czy Yunnan Baiyao może wchodzić w interakcje z aktualnymi lekami (szczególnie chemioterapia lub przeciwkrzepliwe)?
- Jaki schemat polecasz (co drugi dzień vs 5/5) i kiedy reevaluować?
- Co mam monitorować codziennie i kiedy mam przerwać i zadzwonić?

Referencje (krotka lista)

- Tansey C, Wiebe M, et al. Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018. PMID:29727528.
- Frederick J, et al. Can J Vet Res. 2017. PMID:28154462.
- Wirth KA, Kow K, et al. Vet Comp Oncol. 2016. PMID:24976212.
- Chaikin P, Welihozkiy A. Case Rep Vet Med. 2018. PMID:29955437.
- VCA Hospitals: Yunnan Baiyao (owner overview).
- MSPCA-Angell: Yunnan Baiyao - to use or not to use (clinical perspective).

Następne kroki + zasoby

Zacznij od planu z weterynarzem, wybierz odpowiedni produkt tylko jeśli jest zalecany, i monitoruj spokojnie oraz regularnie.

O TCMVET

TCMVET dostarcza przyjazne dla opiekunow materiały, z podejściem integracyjnym i w porozumieniu z opieką weterynaryjną.

O TCMVET Baituxiao

Baituxiao jest pozycjonowany jako integracyjna formuła do długoterminowego zarządzania nowotworami, dla uporządkowanego wsparcia w czasie.

Nota o zasobach (nie reklamowa)

Te kody QR i przyciski są udostępnione jako zasoby do identyfikacji produktu i szczegółów - używaj tylko, jeśli zaleci to weterynarz.

Jesli weterynarz zaleci te produkty:

Zeskanuj kod QR (wydruk) lub kliknij przycisk (PDF cyfrowy).

Kapsulki Yunnan Baiyao (pakiet 10)

Dla opiekunow: szczegoly &
wskazowki

Uzywaj tylko na zalecenie
weterynarza.



**Szczegoly & wskazowki
uzycia**

TCMVET Baituxiao

Dla opiekunow: szczegoly &
wskazowki

Uzywaj tylko na zalecenie
weterynarza.



**Szczegoly & wskazowki
uzycia**

Potrzebujesz pomocy z kolejnymi krokami? Zacznij od weterynarza. Jesli czekasz na wizyte, uzyj dziennika z tego poradnika, aby sledzic zmiany i przekazac jasne informacje.

Alternatywnie: tcm-vet.com (szukaj: yunnan baiyao capsules, baituxiao)